


95 años  
Senosiain®



# ORECIL NF

La g<sup>o</sup>ta exacta

## La otitis del nadador ó externa: <sup>(1)</sup>

- ▶ Es más **frecuente en niños de 5 a 14 años**
- ▶ En más del **90% de los casos su etiología** es debida a *Staphylococcus aureus* y a *Pseudomonas aeruginosa*
- ▶ Dentro de los primeros **síntomas** está la **inflamación, la otalgia y el prurito**



El **tratamiento de elección** debe considerar su **eficacia, adherencia, riesgo de eventos adversos y resistencia.**



**ORECIL NF** le dá los siguientes beneficios: <sup>(2,3)</sup>



Alcanza **mejores concentraciones** locales que la terapia sistémica



**Ofloxacino tópico** tiene un **amplio espectro de actividad por lo que su eficacia** se alcanza en menor tiempo vs. los tratamientos sistémicos



A diferencia de los aminoglucósidos, **no es ototóxico y esto lo hace más seguro** cuando se desconoce si la membrana timpánica está integra



Su combinación con hidrocortisona **disminuye el edema, la otorrea y favorece el alivio del dolor**



Y tiene una **cómoda administración: desde 1 a 2 veces al día** lo que favorece su adherencia

# ORECIL NF®



## Dosis:

Adultos:

10 gotas 1 ó 2 veces al día

Niños de 1 a 12 años:

5 gotas 1 ó 2 veces al día



Reg. No. 67530 SSA IV  
NÚMERO DE ENTRADA: 2311032002C00002

### BIBLIOGRAFÍA:

1. Long M. Otitis externa *Pediatr Rev.* 2013 Mar;34(3):143-4.
2. Narayan S, Swift A Otitis externa : una revisión clínica. *Br J Hosp Med (Londres)*. 2011 octubre; 72 (10): 554-8.
3. Jones RN, Milazzo J, Seidlin M. Solución ótica de ofloxacina para el tratamiento de la otitis externa en niños y adultos. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 1997 noviembre; 123 (11): 1193-200. doi:

Revisar IPP:



Inspirado en la obra: **El grito** | Artista: **Edvard Munch**

OREC-01D-23

<https://www.shutterstock.com/image-vector/painter-painting-expressionist-man-screaming-773758933>

 IPAL®

**Senosiain®**