




MICCIL®

El diurético rápido y seguro



En estudios a corto
y largo plazo, **MICCIL** es
altamente efectivo. ⁽²⁾

Le ofrece una **mejor
respuesta clínica** porque
su biodisponibilidad es mayor. ⁽¹⁾



MICCIL es tratamiento de elección

- ✓ En Insuficiencia **Cardiaca y Renal** ^(1 y 2)
- ✓ Edema asociado a **Síndrome Nefrótico**
- ✓ **Ascitis**
- ✓ Edema Pulmonar

✓ MICCIL es útil pacientes resistentes a otros diuréticos

MICCIL®



MICCIL Intravenoso puede administrarse en forma directa **en un lapso de 1-2 minutos o por venoclisis.**

Dosis oral:

Se recomienda administrar **un comprimido de 1 mg** por la mañana, dosis máxima 15mg.

Dosis intravenosa:

1 a 2 ampolletas (0.5 a 1 mg).

En caso necesario, añadir de una a dos ampolletas en intervalos de 2 a 3 horas con dosis máxima diaria de 15 mg. De acuerdo a la respuesta, se recomienda cambiar a la vía oral tan pronto como sea posible.

Dosis ponderal:

0.025 mg/kg pudiéndose repetir cada 6 hrs si es necesario.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Lingling Wu , Mario Rodriguez , Karim El Hachem , Chayakrit Krittanawong
Diuretic Treatment in Heart Failure: A Practical Guide for Clinicians J Clin Med 2024 Jul 30;13(15):4470.
2. Ward A, Heel RC. Bumetanide. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties and therapeutic use. Drugs. 1984 Nov;28(5):426-64. doi: 10.2165/00003495-198428050-00003.PMID: 6391889 Review.

PRODUCTO

NO. DE REG.

MICCIL SOLUCIÓN
MICCIL SOLUCIÓN INYECT.

0029M80 SSA IV
86174 SSA IV

NÚMERO DE ENTRADA: 2511032002C00015

Revisar IPP:



MICC-01D-25

Pintura: Barcos en el océano. Autor: Ivailo Nikolov