




95
años
Senosiain®

Analgesica



**CUANDO BUSCA
EFICACIA**



**Anti-
inflamatoria**

FACICAM[®]

Eficacia
Antiinflamatoria



Eficacia sin riesgos

En el control de la **inflamación aguda**

- ✓ En pacientes con restricción del movimiento y limitación de la actividad física por:
- ✓ Esguince de **tobillo**
- ✓ Lesión de articulación **acromioclavicular**
- ✓ Lesiones de partes **blandas del hombro**
- ✓ Lesiones de **rodilla y cadera**

FACICAM 40mg al día por 2 días, y posteriormente 20mg al día, **disminuyó la inflamación, el dolor y el aumento de la sensibilidad** en atletas, con 3 días de tratamiento. ⁽⁵⁾





En el control de la inflamación crónica como:



Osteoartritis



Artritis reumatoide



Dolor crónico

FACICAM resultó **más eficaz** que Naproxén e Indometacina. ⁽⁶⁾

FACICAM tiene un mejor perfil de **seguridad y eficacia** que otros AINEs. ⁽⁶⁾


RAPIX®


Eficacia
Analgésica

Rápido alivio al dolor

Después de Cirugía: ⁽¹⁾

- ✓ **Es efectivo** en el control del dolor moderado a intenso
- ✓ **Disminuye** el requerimiento de opioides
- ✓ Lo que se asocia con una **mejor calidad de recuperación**
- ✓ Y una **alta más temprana** en los pacientes ambulatorios





En dolor dental




RAPIX 30 mg fue más efectivo que Tramadol 50mg en cirugía del tercer molar ⁽²⁾



En Cirugía ortopédica



RAPIX ha demostrado eficacia similar a Morfina 10mg ⁽³⁾



Migraña



La revisión sistemática de 8 estudios concluye que es una alternativa efectiva en los ataques agudos de migraña ⁽⁴⁾


RAPIX[®] FACICAM[®]



NÚMERO DE ENTRADA: 2311032002C00004

BIBLIOGRAFÍA:

1. Wheatley RG. Eficacia analgésica del ketorolaco. Acta Anaesthesiol Belg 1996;47(3):135-42.
2. Pathi J, Vidya KC, Sangamesh NC Tramadol versus ketorolaco para el manejo del dolor después de la cirugía del tercer molar. Natl J Maxillofac Surg. 2020 julio-diciembre;11(2):236-240.
3. Maslanka, M A, et al. Comparison Of Oral Ketorolac, Intramuscular Morphine, And Placebo For Treatment Of Pain After Orthopedic Surgery. Southern Medical Journal 87.4 (1994): 506-513.
4. Ketorolaco en el tratamiento de la migraña aguda: una revisión sistemática. Taggart E, et al. Dolor de cabeza. 2013.
5. HH McIlwain , RD Platt Piroxicam versus naproxeno en el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos agudos en deportistas. Soy J Med. 1988; 84 (5A): 56-60.
6. Rico F. Revisión de la eficacia y seguridad del Piroxicam. Un metanálisis global de ensayos clínicos aleatorizado Pharmacol Res.2009 octubre; 60 (4): 254-63.



Revisar IPP:



Revisar IPP:



RAPI-FACI-01D-23



Senosiain[®]