Senosiain®

Aceler®
(Ácido fusídico)
Crema
Antibiótico tópico

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN
Cada 100 g de crema contienen:

Ácido fusídico	2 g
Excipiente c.b.p.	100 g

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Aceler está indicado en el tratamiento de infecciones cutáneas como: impétigo, furunculosis, carbuncos, hidrosadenitis, paroniquias, eritrasma y sicosis de la barba; producidas por estafilococos, estreptococos y otros microorganismos patógenos sensibles a **Aceler** y como profilaxis en quemaduras.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
Aceler es un antibiótico obtenido por fermentación del hongo *Fusidium coccineum*. Está clasificado dentro de los antibióticos triterpenoides tetracíclicos naturales.
Aceler ejerce su acción antibacteriana mediante un proceso de inhibición de las proteínas que causan una serie de cambios degenerativos que conducen al colapso total de la pared celular bacteriana.
Aceler penetra a la piel intacta, su absorción está influida tanto por su composición estereoquímica como por las características especiales de su vehículo a base de una crema neutra, hasta un 2% de la dosis aplicada de **Aceler** penetra la piel intacta, en capa córnea dañada, la concentración alcanzó hasta 100-150 mcg/ml, en capa córnea intacta, la concentración de **Aceler** alcanza 0.8 mcg/ml.
Al cabo de 16 horas se pudo remover sólo 80% del ácido fusídico, lo cual indica que el 10-20% penetra la piel.
Más del 95% de la droga está unida a las proteínas, su excreción es lenta y principalmente por vía biliar, el antibiótico es ampliamente distribuido a todo el organismo, es activo contra gran variedad de bacterias grampositivas, incluyendo *Staphylococcus aureus* productor de penicilinasa. Asimismo, sobre cocos y bacilos gramnegativos.
La actividad bacteriana no disminuye en presencia de pus. No existe resistencia cruzada entre **Aceler** y otros antibióticos de uso clínico.
Por consiguiente, cepas multirresistentes a un gran número de antibióticos son frecuentemente sensibles a **Aceler**.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, infecciones micóticas o virales.

PRECAUCIONES GENERALES
Para la aplicación de **Aceler** se deberá proceder con la mayor asepsia posible, deberá evitarse que el medicamento penetre a los ojos, ya que podría causar irritación conjuntival.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Estudios en animales no demostraron efectos teratogénicos sin embargo, al igual que otros antibióticos su empleo durante estas etapas queda bajo responsabilidad del médico.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS
En menos del 1% de los casos, se ha reportado sensación de prurito en el sitio de aplicación, irritación cutánea y eritema.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO
Hasta el momento no se han reportado.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE

PRUEBAS DE LABORATORIO
Hasta el momento no se han reportado.

PRECAUCIONES EN RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD
Aceler carece de efectos carcinogenéticos, mutagénicos, teratogénicos o sobre la fertilidad.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Aceler crema se aplica en la zona infectada 2 o 3 veces al día, generalmente durante un lapso de 7 días.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL
No existen datos de sobredosificación.

PRESENTACIÓN
Aceler crema: Caja con tubo con 15 g.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO
Consérvese el tubo bien cerrado a temperatura ambiente a no más de 30°C.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN
Literatura exclusiva para médicos.
No se deje al alcance de los niños.
Su venta requiere receta médica.

HECHO EN MÉXICO POR:
Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.
Camino a San Luis Rey No. 221.
Ex Hacienda Santa Rita.
C.P. 38137, Celaya, Guanajuato. México.

Reg. No. 365M2008 SSA IV

® Marca Registrada