

FLUMIL®

(Aminofenazona, bufenina, difenilpiralina)

Cápsulas y solución gotas
Antihistamínico, analgésico y
descongestivo nasal



FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Cada cápsula contiene:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Aminofenazona | 40.0 mg |
| Clorhidrato de bufenina | 1.5 mg |
| Clorhidrato de difenilpiralina | 1.5 mg |
| Excipiente c.b.p. | 1 cápsula |

Cada 100 ml de solución contiene:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Aminofenazona | 2.0 g |
| Clorhidrato de bufenina | 75 mg |
| Clorhidrato de difenilpiralina | 75 mg |
| Vehículo c.b.p. | 100 ml |

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Antihistamínico, analgésico y descongestivo nasal.

Auxiliar en el alivio de los síntomas de la rinitis aguda, rinitis alérgica, sinusitis y rinofaringitis.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

FLUMIL representa un concepto terapéutico diferente. La aminofenazona es un analgésico, antipirético y antiinflamatorio que disminuye la inflamación y los síntomas generales, se absorbe rápidamente del tracto gastrointestinal teniendo una vida media de 1 a 4 horas y es excretada por vía renal. La bufenina se absorbe bien desde el tubo digestivo, es un vasodilatador periférico que estimula la circulación de la mucosa nasal, combate la isquemia, la estasis y elimina las sustancias tóxicas, lo cual clínicamente se manifiesta en la disminución de la congestión nasal.

La difenilpiralina es un antihistamínico perteneciente al grupo de las etanolaminas resultado de la incorporación de un anillo piperidina, su mecanismo de acción consiste en competir con la histamina disminuyendo las

secreciones nasales por lo que combate eficazmente la rinorrea, su vida media de eliminación es de 24 a 40 horas, su metabolismo es hepático y su eliminación renal.

CONTRAINDICACIONES

Úlcera péptica activa e hipersensibilidad hacia alguno de los componentes de la fórmula, taquicardia paroxística, infarto del miocardio, angina de pecho grave, hipertiroidismo, anemia, adenoma prostático, glaucoma, agranulocitosis, anemia aplástica.

PRECAUCIONES GENERALES

No debe administrarse junto con depresores del sistema nervioso, ni con bebidas alcohólicas. Este medicamento contiene un antihistamínico. No debe manejarse vehículos, ni operar máquinas.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Al igual que la mayoría de los fármacos no debe darse a mujeres embarazadas o lactando.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Eventualmente puede producir palpitaciones, cefalea, sequedad de boca y nariz, agranulocitosis, mareos, náuseas, nerviosismo, taquicardia, hipotensión arterial, somnolencia, sedación, laxitud, retención urinaria, porfiria.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

El clorhidrato de difenilpiralina potencia los efectos de anticolinérgicos como la atropina y los antidepresivos tricíclicos.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE

PRUEBAS DE LABORATORIO

Hasta este momento no se han detectado.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

Tras la administración de **FLUMIL** no se han reportado alteraciones mutagénicas, teratogénicas ni sobre la fertilidad.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

Cápsulas:

Niños mayores de 12 años y adultos: 2 cápsulas como dosis inicial, continuando con 1 cápsula desde 3 veces al día hasta cada 4 horas.

Solución gotas (20 gotas = 1 ml):

Lactante y niños hasta 12 años: 1 gota/Kg de peso /toma, desde 3 veces al día hasta cada 4 horas (no exceder de 35 gotas por toma).

Niños mayores de 12 años y adultos: 4 ml como dosis inicial y después 2 ml desde 3 veces al día hasta cada 4 horas.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

Hasta al momento no hay información acerca de sobredosificación, sin embargo, se sugiere tomar las medidas generales en caso de que se presente.

PRESENTACIONES

Caja con 20 cápsulas.

Frasco con 25 ml de solución y gotero graduado.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Literatura exclusiva para médicos.

No se deje al alcance de los niños.

Su venta requiere receta médica.

HECHO EN MÉXICO POR:

Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.

Camino a San Luis Rey No. 221.

Ex Hacienda Santa Rita.

C.P. 38137, Celaya, Guanajuato. México.

| Producto | No. de Reg. |
|------------------------|--------------|
| FLUMIL cápsulas | 82442 SSA IV |
| FLUMIL solución | 82432 SSA IV |

® Marca Registrada