

Sies®

(Hidrosmina)
Cápsulas
Flebotónico



FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Cada cápsula contiene:

Hidrosmina 200 mg
Excipiente c.b.p. 1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Sies está indicado en el alivio a corto plazo (durante dos o tres meses), del edema y síntomas relacionados con la insuficiencia venosa crónica, várices, hemorroides, fragilidad capilar, hemorragia subconjuntival o retiniana.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

Sies se absorbe adecuadamente después de su administración oral, observándose concentraciones plasmáticas de carácter bifásico, un pico inicial a los 15 minutos alcanzando una fase de estabilización entre 5 y 8 horas.

La eliminación de hidrosmina es rápida, 90% de la dosis en 48 horas, su principal vía de eliminación son las heces 80% y por orina del 16 a 18%.

Sies es un flabonoide cuyo principio activo es la hidrosmina, su mecanismo de acción no ha sido totalmente esclarecido, pero se relaciona con la inhibición de la degradación de catecolaminas a través de la inhibición de la catecol-O-metiltransferasa.

Podemos concretar en cuatro las principales acciones farmacológicas de hidrosmina: *reduce* la permeabilidad capilar inducida por diversos agentes como histamina, bradicinina, etcétera y reduce la fragilidad capilar inducida por dieta carencial. *Aumenta* la deformabilidad de los hematíes y disminuye la viscosidad de la sangre. *Induce* la contracción de la musculatura lisa de la pared venosa de forma mantenida y gradual. *Produce* dilatación de los colectores linfáticos y un aumento de la velocidad de conducción linfática, mejorando así el flujo linfático.

CONTRAINDICACIONES

Sies está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES GENERALES

Hasta este momento no existen estudios que comprueben el uso en niños.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se dispone de datos clínicos, los estudios realizados en animales no mostraron efecto alguno durante el embarazo, desarrollo fetal, parto ni desarrollo postnatal.

Sies no se excreta a través de la leche materna por lo que se puede utilizar durante el período de lactancia.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Generalmente **Sies** es bien tolerado; sin embargo, se han observado dolor epigástrico, náuseas, mareos, cefalea, rash y prurito.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Hasta este momento no existen datos en cuanto a interacciones medicamentosas ni con alimentos.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

Hasta el momento no existen evidencias sobre alteraciones de pruebas de laboratorio.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

Los estudios efectuados en animales no mostraron efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis ni sobre la fertilidad.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

La dosis inicial y habitual es de 1 cápsula de 200 mg cada ocho horas, en los casos de brotes agudos hemorroidales se recomienda el doble de la dosis habitual.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

La buena tolerancia de **Sies** hace que la posibilidad de intoxicación sea nula en la práctica.

PRESENTACIONES

Caja con 20 cápsulas.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

No se deje al alcance de los niños.
Su venta requiere receta médica.
Literatura exclusiva para médicos.

HECHO EN MÉXICO POR:

Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.
Camino a San Luis Rey No. 221.
Ex-Hacienda Santa Rita.
C.P. 38137 Celaya, Guanajuato. México.

Reg. No. 019M95 SSA IV

® Marca Registrada