

Enroxil®

(Enrofloxacin)

Tabletas, solución inyectable y solución oral.

Antimicrobiano de amplio espectro y micoplasmicida.



Fórmula.

Enroxil® Inyectable 5%

Cada mL contiene

Enrofloxacin 50 mg
Vehículo cbp 1 mL

Enroxil® Inyectable 10%

Cada mL contiene

Enrofloxacin 100 mg
Vehículo cbp 1 mL

Enroxil® 10% Solución Oral

Cada mL contiene

Enrofloxacin 100 mg
Vehículo cbp 1 mL

Enroxil® Dosificador Solución Oral

Cada mL contiene

Enrofloxacin 2 mg
Vehículo cbp 1 mL

Enroxil® Tabletas 150 mg

Cada Tableta contiene

Enrofloxacin 150 mg
Excipiente cbp 1 Tableta

Es una Quinolona fluorada que actúa sobre la unidad A y sobre la unidad B de la topoisomerasa II (DNA-Girasa), presenta una gran actividad contra bacterias Gram (+), Gram (-) y micoplasmas. Su absorción es excelente alcanzando altas concentraciones en tejidos. Tiene una alta biodisponibilidad, es parcialmente metabolizado en hígado a ciprofloxacina y se elimina a través de la vía renal por filtración glomerular y por excreción tubular.

Enroxil® Solución Inyectable al 5 %

Está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas de origen bacteriano del aparato respiratorio, digestivo, genitourinario y tegumentario para Bovinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos, Caninos y Felinos.

Dosis.

Bovinos

productores de carne

Porcinos

Ovinos

Caprinos

Caninos

Felinos

} 2.5 mg/Kg de peso equivalente a 1 mL/20 Kg de peso corporal

} 5 mg/Kg de peso, equivalente a 1 mL/10 Kg de peso corporal

Tratamiento.

Cada 24 horas de 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración.

Intramuscular profunda (IM), subcutánea (SC) e intravenosa lenta (IV).

Enroxil® Solución Inyectable al 10%

Está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas de origen bacteriano del aparato respiratorio, digestivo, genitourinario y tegumentario para Bovinos, Porcinos, Caprinos y Ovinos.

Dosis.

Bovinos

productores de carne

Porcinos

Caprinos

Ovinos

2.5 mg/Kg de peso equivalente a 1 mL/40 Kg de peso corporal

Tratamiento.

Cada 24 horas de 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración.

Intramuscular profunda (IM), subcutánea (SC) e intravenosa lenta (IV).

Enroxil® Dosificador

Está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas de origen bacteriano del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario en Bovinos (becerros), Porcinos (lechones) y Ovinos (corderos).

Dosis.

Bovinos (**becerros**)

Porcinos (**lechones**)

Ovinos (**corderos**)

2.5 mg/Kg de peso corporal.

Modo de empleo.

Cada disparo del dosificador equivale a 1 ml, aplicar la cantidad recomendada a criterio del Médico Veterinario.

Tratamiento.

Cada 24 horas, de 3 a 5 días.

Vía de administración.

Oral.

Instrucciones para colocar el dosificador.

1. Sacar el dosificador de su empaque.
2. Abrir la tapa del frasco.
3. Colocar el dosificador en el frasco, asegurando que cierre perfectamente.
4. Para abrir el dosificador, sujetar el frasco con una mano y con la otra girar la boquilla del dosificador en sentido contrario a las manecillas del reloj.
5. Una vez hecha esta operación, está listo para su uso.

Nota: Cada vez que se vaya a administrar el producto, debe accionarse 2 o 3 veces la válvula del dosificador para garantizar que cada disparo corresponda exactamente a 1 mL.

Enroxil® 10% Solución Oral

Está indicado en el tratamiento de infecciones del sistema respiratorio, digestivo y genitourinario de los animales causadas por gérmenes Gram (+), Gram (-) y Micoplasmas susceptibles a la fórmula, en Pollo de engorda, Bovinos productores de carne y porcinos.

Dosis.

10 mg/Kg de peso o 1 mL/2 L de agua de bebida por 3 a 5 días o **1 L /2,000 L** de agua.

| Mililitros | L de agua |
|------------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1,000 | 2,000 |

Tratamiento.

3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración.

Oral, soluble en agua de bebida.

Enroxil® Tabletas 150 mg Trisectadas

Está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas de origen bacteriano del aparato respiratorio, digestivo, genitourinario y tegumentario, que afectan a **Caninos y Felinos** domésticos.

Dosis.

1 tableta por cada 30 Kg de peso corporal equivalente en caninos y felinos a **5 mg/Kg de peso**.

Sugerencia de dosificación

| Kg/peso | Tabletas |
|---------|----------|
| 10 | 1/3 |
| 20 | 2/3 |
| 30 | 1 |
| 40 | 1 1/3 |

Tratamiento.

Cada 24 horas por 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración.

Oral.

Advertencias y Tiempo de Retiro.

Enroxil® Solución Inyectable al 5 y al 10%

No usar el producto 28 días antes del sacrificio de los animales. No administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

Enroxil® Dosificador

No usar el producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

Enroxil® 10% Solución Oral

No consumir carne de los animales tratados, sino hasta 5 días después de la última administración. No administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

Enroxil® Tabletas 150 mg

No administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.

Presentaciones.

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| Enroxil® Solución Inyectable 5% | Frascos con 20 mL, 50 mL y 250 mL | Registro. Q-6066-007 |
| Enroxil® Solución Inyectable 10% | Frascos con 25 mL y 250 mL | Q-6066-009 |
| Enroxil® Solución Oral 10% | Oral Frasco con 1 Litro | Q-6066-017 |
| Enroxil® Dosificador solución oral | Frasco con 100 mL | Q-6066-016 |
| Enroxil® Tabletas 150 mg | Caja con 10 Tabletas de 150 mg c/u | Q-6066-003 |

Hecho en México por y para

Laboratorios Senosiain S.A. de C.V., Lago Silverio N° 177, Col. Anáhuac, 11320, Ciudad de México.

www.senosiain.mx

Senosiain®