

Reugol®

(Piroxicam)

Solución inyectable y Gel.
Antiinflamatorio no esteroide.

Uso Veterinario.



Fórmula.

SOLUCIÓN INYECTABLE.

Cada mL contiene.

Piroxicam	20 mg
Vehículo c.b.p.	1 mL

GEL TÓPICO.

Cada 100 g contienen.

Piroxicam	0.500 g
Excipiente c.b.p.	100 g

Farmacocinética y Farmacodinamia.

Reugol® 2% Inyectable

Es un Antiinflamatorio No Esteroide, que se absorbe rápidamente al ser administrado por vía parenteral alcanzando concentraciones plasmáticas entre 3 y 5 horas, con alto poder de penetración en todos los tejidos y líquidos corporales, manteniendo niveles terapéuticos, su vida media es superior a 36 horas, sufre metabolismo hepático y se excreta por vía renal. Inhibe varios procesos celulares y bioquímicos del proceso inflamatorio, la quimiotaxis de monocitos polimorfonucleares al sitio de la inflamación, el proceso de fagocitosis, la liberación de hidrolasas lisosomales, la agregación plaquetaria y la liberación de superóxido e hidroxilos para los tejidos.

Reugol® Gel

Inhibe la síntesis y liberación de prostaglandinas por medio de la inhibición reversible de la enzima ciclooxigenasa, después de su administración se libera en forma gradual y continua desde la piel hacia el tejido muscular y líquido sinovial, alcanzando con rapidez un equilibrio entre la piel y el músculo o el líquido sinovial en el curso de unas horas después de su aplicación.

Indicaciones.

Reugol® 2% Inyectable

Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de afecciones que cursan con inflamación y dolor. Bovinos productores de leche y de carne, caprinos y ovinos: Mastitis, pododermatitis y neumonías. Porcinos: Síndrome MMA y cojera. Equinos: Artritis, sinovitis, bursitis y tendinitis. Caninos: Displasia de la cadera, artritis, traumatismos y procesos postquirúrgicos.

Reugol® Gel Está indicado como coadyuvante en el tratamiento de afecciones que cursan con inflamación, hiperalgia e hipertermia, antiinflamatorio de aplicación externa en bovinos productores de leche y de carne, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, caninos y felinos.

Dosis.

Reugol® 2% Solución inyectable.

Bovinos, equinos, caprinos y ovinos.

Porcinos.

Caninos.

3-5 mL/100 Kg equivalente a **0.6 a 1 mg/Kg de peso** corporal.

0.5-2 mL/20 Kg equivalente a **0.5 a 1 mg/Kg de peso** corporal.

0.5 mL/35 Kg equivalente a **0.3 mg/Kg de peso** corporal.

Vía de administración.

Intramuscular profunda (IM).

Tratamiento.

Reugol® 2% inyectable

Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos, cada 24 h de 3 a 5 días.

Caninos cada 48 h de 3 a 5 días.

Reugol® Gel

Aplique suficiente cantidad de **Reugol® Gel** sobre la zona afectada frotando durante el tiempo necesario hasta que el producto se haya impregnado. Repita el tratamiento cada 12 a 24 horas según sea el caso hasta la recuperación de la lesión. En caso de heridas y/o incisiones quirúrgicas aplique la cantidad suficiente acompañado del tratamiento antimicrobiano de su elección hasta la recuperación total.

Vía de administración.

Cutánea.

Reugol® Gel

Aplicar hasta la recuperación total.

Advertencias.

Reugol® 2% Inyectable

No se recomienda mezclar con otros medicamentos en la misma jeringa. No usar el producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No utilizar la leche de los animales tratados para consumo humano hasta 72 horas después de la última administración. No administrar este producto a Equinos destinados al consumo humano. No administrar el producto después de la fecha de caducidad. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

Reugol® Gel

En especies destinadas para consumo humano no usar el producto 24 horas antes del sacrificio de los animales. No consumir leche de los animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación. No administrar este producto a equinos destinados al consumo humano. Mantenga el tarro bien cerrado, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. No administrar el producto después de la fecha de caducidad. No se deje al alcance de los niños.

Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.

Presentaciones.

Reugol® 2% Inyectable

Frasco con 100 mL

Frasco con 250 mL

Registro: Q-6066-025

Reugol® Gel

Tarro con 250 g

Registro: Q-6066-034

Hecho en México por y para

Laboratorios Senosiain, SA de CV, Lago Silverio N° 177, Col. Anáhuac CP 11320, Ciudad de México.

www.senosiain.mx

Senosiain®