

## enroxil®

(Enrofloxacin)

Tabletas, solución inyectable y solución oral.

Antimicrobiano de amplio espectro y micoplásmica.



### FORMA FARMACÉUTICA Y FÓRMULA

#### Fórmula

##### **enroxil Inyectable 5%**

Cada mL contiene

Enrofloxacin 50 mg

Vehículo cbp 1 mL

##### **enroxil Inyectable 10%**

Cada mL contiene

Enrofloxacin 100 mg

Vehículo cbp 1 mL

##### **enroxil Oral 10%**

Cada mL contiene

Enrofloxacin 100 mg

Vehículo cbp 1 mL

##### **enroxil Oral 0.2%**

Cada mL contiene

Enrofloxacin 2 mg

Vehículo cbp 1 mL

##### **enroxil tabletas**

Cada Tableta contiene

Enrofloxacin 150 mg

Excipiente cbp 1 Tableta

### INDICACIONES

**enroxil** está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas de origen bacteriano del aparato respiratorio, digestivo, genitourinario, tegumentario y septicémico, para Bovinos productores de carne, Pollo de engorda, Porcinos, Caprinos, Ovinos, Caninos y Felinos.

### DOSIS

Ponderal 2.5 mg/Kg de peso corporal

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bovinos productores de carne | 1 mL/20 Kg de peso corporal <b>enroxil</b> 5 %<br>1 mL/40 Kg de peso corporal <b>enroxil</b> 10 % |
| Porcinos                     |   |
| Ovinos                       |   |
| Caprinos                     | Dosis Ponderal<br>5 a 10 mg/Kg de peso corporal   |
| Caninos                      |   |
| Felinos                      |   |

## FARMACOCINÉTICA FARMACODINAMIA

Es una Quinolona que actúa sobre la unidad A y sobre la unidad B de la Topoisomerasa II (DNA-Girasa), presenta una gran actividad contra bacterias Gram (+), Gram (-) y Micoplasmas. Su absorción es excelente, alcanzando altas concentraciones en tejidos, tiene una alta biodisponibilidad, es parcialmente metabolizado en hígado a Ciprofloxacina y se elimina a través de la vía renal por filtración glomerular y por excreción tubular.

## TRATAMIENTO

**enroxil** 5% inyectable 1 mL/20 Kg de peso corporal cada 24 horas, de 3 a 5 días en Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos.

**enroxil** 10% inyectable 1 mL/40 Kg de peso corporal cada 24 horas, de 3 a 5 días en Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos.

*Vía de administración:* Intramuscular profunda, subcutánea e intravenosa lenta.

**enroxil** Dosificador solución oral al 0.2% en Lechones, Becerros y Corderos

| Kg/peso | Mililitros |
|---------|------------|
| 5       | 3          |
| 10      | 6          |
| 20      | 12         |
| 30      | 18         |
| 40      | 24         |
| 50      | 30         |

Tratamiento: 3 mL/5 kg de peso corporal cada 24 horas de 3 a 5 días.

*Vía de administración:* Oral

**enroxil** 10% Solución oral

| Mililitros | Litros de agua |
|------------|----------------|
| 1          | 2              |
| 1,000      | 2,000          |

Tratamiento: Cada 24 horas de 3 a 5 días.

*Vía de administración:* Oral, soluble en agua de bebida.

**enroxil** Tabletas 150 mg trisectadas

| Ponderal: 5 a 10 mg/kg de peso corporal |          |
|---|----------|
| Kg/peso                                 | Tabletas |
| 10                                      | 1/3      |
| 20                                      | 2/3      |
| 30                                      | 1        |
| 40                                      | 1 1/3    |
| 50                                      | 1 2/3    |
| 60                                      | 2        |

Tratamiento: 1 tableta por cada 30 kg de peso corporal cada 24 horas por 5 días.

*Vía de administración:* Oral.

## ADVERTENCIAS

No usar el producto 5 días (solución oral) y 6 días (solución inyectable) antes del sacrificio de los animales. No consumir leche y carne de los animales tratados sino hasta 5 días después de la última administración, no administrar este producto a Equinos destinados al consumo humano, no administrar el producto después de la fecha de caducidad, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

## DESTRUCCIÓN DE LOS ENVASES VACÍOS

Deberán desecharse en forma segura en la basura municipal.

Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.

## PRESENTACIONES

|                      |                                    |                         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>enroxil</b> 5%    | Frascos con 20 mL, 50 mL y 250 mL  | Reg. SAGARPA Q-6066-007 |
| <b>enroxil</b> 10%   | Frascos con 25 mL y 250 mL         | Reg. SAGARPA Q-6066-009 |
| <b>enroxil</b> 10%   | Frasco con 1 Litro                 | Reg. SAGARPA Q-6066-017 |
| <b>enroxil</b> 0.2 % | Frasco con 100 mL                  | Reg. SAGARPA Q-6066-016 |
| <b>enroxil</b>       | Caja con 10 tabletas de 150 mg c/u | Reg. SAGARPA Q-6066-016 |

Hecho en México por:

**Laboratorios Senosiain S.A. de C.V.**

Lago Silverio N° 177

Col. Anáhuac, 11320, CDMX

[www.senosiain.mx](http://www.senosiain.mx)

®Marca registrada