

Respivet®

Polvo estéril para reconstituir a
suspensión inyectable
Uso Veterinario



Fórmula.

Hecha la mezcla, cada mL de Suspensión contiene:

Penicilina G Procaína	150,000 UI
Penicilina G Sódica	50,000 UI
Dipirona Sódica	250 mg
Guayacol	50 mg
Agua grado Inyectable c.b.p.	1 mL

Farmacocinética y Farmacodinamia.

Respivet®, pertenece al grupo de los β -lactámicos de alta eficacia, inhibe la síntesis de la pared celular de la bacteria esencial para su proliferación y desarrollo, reduce la fiebre por acción en el centro regulador de la temperatura del hipotálamo y produce analgesia al elevar el umbral del dolor, su acción expectorante aumenta las secreciones del tracto respiratorio mediante mecanismo de reflejo a partir de la irritación de la mucosa gástrica aumentando la fluidez de las secreciones del tracto respiratorio. Después de su administración parenteral se absorbe con rapidez alcanzando cifras máximas en el plasma en 15 a 30 minutos, descendiendo rápidamente por lo que no hay tiempo para que se acumule en concentraciones elevadas en numerosos tejidos, y en el LCR es mínima la concentración, excepto en meningitis, presenta vidas medias de 0.5-1 a 2 horas en todas las especies animales, se distribuye en líquidos extracelulares, se excreta en la orina en partes por filtración glomerular 15%, por secreción tubular 80% y una pequeña fracción por bilis.

Indicaciones.

Respivet® está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel, tejidos blandos y septicemias causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-), así como mastitis, metritis, neumonías, septicemias, abscesos y heridas.

Modo de Preparación.

Agregue el contenido del diluyente al frasco ampula que contiene el polvo, agítese vigorosamente hasta conseguir una suspensión de aspecto uniforme, después de reconstituir inyecte el producto en condiciones de asepsia.

Dosis.

Bovinos productores de carne y de leche:	20,000 a 22,000 UI/Kg de peso, equivalente a 1mL por cada 10 Kg de peso corporal
Porcinos Caprinos	
Equinos	22,000 a 25,000 UI/Kg de peso, equivalente a 1mL por cada 10 Kg de peso corporal
Caninos Felinos	20,000 a 40,000 UI/Kg de peso, equivalente a 1mL por cada 10 Kg de peso corporal

Tratamiento.

1 aplicación cada 24 horas de 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.

Vía de administración.

Intramuscular Profunda.

Advertencias.

No administrar el producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No administrar este producto a Equinos destinados al consumo humano. No usar la leche procedente de animales tratados sino hasta 3 días después de la última aplicación. No se administren en animales hipersensibles a los componentes de la fórmula, consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en lugar seco y fresco, protegido de la luz. No administrar el producto después de la fecha de caducidad. Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria. No se deje al alcance de los niños.

Su Venta Requiere Receta Médica.

Consulte Al Médico Veterinario.

Presentaciones: Frasco ampula y diluyente que contienen.

Frasco ampula:	800,000 UI	2'000,000 UI	4'000,000 UI	6'000,000 UI
Penicilina G Procaína	600,000 UI	1'500,000 UI	3'000.000 UI	4'500,000 UI
Penicilina G Sódica	200,000 UI	500,000 UI	1'000.000 UI	1'500,000 UI
Frasco Diluyente:				
Dipirona Sódica	1,000 mg	2,500 mg	5,000 mg	7.5 g
Guayacol Líquido	200 mg	500 mg	1,066 mg	1.548 g
Agua grado Inyectable cbp	4 mL	10 mL	20 mL	30 mL

Registro: Q-6066-005

Hecho en México por y para

Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. Lago Silverio N° 177, Col. Anáhuac, 11320, Ciudad de México.

www.senosiain.mx

Senosiain®