

SenCox® 5%

(Toltrazuril)

Suspensión oral.

Anticoccidiano.

Uso Veterinario.



Fórmula.

Cada mL contiene:

Toltrazuril 50 mg

Vehículo c.b.p 1 mL

Farmacocinética y Farmacodinamia.

Anticoccidiano que conduce a la ruptura total del ciclo del desarrollo del protozoo del género *Eimeria spp.* Afectando las etapas intracelulares en los ciclos de reproducción asexual (Esquizogonia) y sexual (Gametogonia), induce cambios en la estructura y desarrollo de la coccidia al aumentar el tamaño del retículo endoplasmático, aparato de Golgi y producir anomalías en el espacio perinuclear. Al administrar **SenCox 5%** por vía oral se absorbe al menos un 46% de la dosis, su vida media es de 48 horas, alcanza concentraciones máximas en hígado y riñones, sin embargo, la sustancia no se acumula y se elimina en todos los tejidos corporales.

Indicaciones.

Es un derivado del Triacino benceno, utilizado para el tratamiento de la coccidiosis causada por protozoarios del género *Eimeria spp.*, puede administrarse en casos de coccidiosis donde se encuentran involucradas una o más especies de Eimerias que han presentado resistencia a otras sustancias con acción coccidicida.

Dosis.

Ponderal 15 a 20 mg por Kg peso corporal en Bovinos (becerros), Porcinos, Ovinos, Caprinos y Caninos, equivalente a 1 mL/2.5 Kg de peso corporal.

Vía de administración.

Oral.

Modo de empleo.

Toma directa con uso del dosificador, cada disparo equivale a 1 mL.

Tratamiento.

Administre la dosis recomendada **por única vez.**

Advertencias.

No debe consumirse carne de animales tratados hasta después de los 70 días posteriores a la última administración. No administrar el producto después de la fecha de caducidad. No se deje al alcance de los niños.

Instrucciones para colocar el dosificador.

1. Sacar el dosificador de su empaque. **2.** Abrir la tapa del frasco de **SenCox® 5%**. **3.** Colocar el dosificador en el frasco, asegurando que cierre perfectamente. **4.** Para abrir el dosificador, sujetar el frasco con una mano y con la otra girar la boquilla del dosificador en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez hecha esta operación, **SenCox® 5%** está listo para su uso. **5.** Después de usarse, retirar el dosificador del frasco y colocar adecuadamente su tapa original. **6.** Enjuagar perfectamente con agua el dosificador. **7.** Guardar el dosificador y el frasco en su empaque original. Para cerrar el dosificador, deberá estar colocado en el frasco y girar en sentido de las manecillas del reloj sin presionar.

Nota: Cada vez que se vaya a administrar el producto, debe accionarse 2 o 3 veces la válvula del dosificador para garantizar que cada disparo corresponda exactamente a 1 mL.

Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.

Presentación.

SenCox 5% Frasco con 250 mL

Registro: Q-6066-042

Hecho en México por y para

Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. Lago Silverio N° 177, Col. Anáhuac, 11320, Ciudad de México.

www.senosiain.mx

Senosiain®