



INFECCIÓN
TORMENTOSA

Ciproflox

DM

Difusión matricial controlada

Las infecciones de vías urinarias constituyen el proceso infeccioso bacteriano más común.



1 de cada 3 mujeres antes de los 24 años requerirá tratamiento para IVU



Del 40 al 50% de las mujeres tendrá una IVU a lo largo de su vida



En varones > 50 años, el diagnóstico urológico más frecuente es prostatitis ^(1,2)





➤ En función de su **perfil farmacológico y liberación prolongada**, **Ciproflo DM** brinda:

- **Amplio espectro de acción**
- **Buena respuesta clínica y bacteriológica**
- **Apego al tratamiento y buen perfil de tolerancia** ^(1,2)



➤ **Ciproflo DM** al administrarse **una vez al día**, es la terapia de elección en:

- **Cistitis**
- **Pielonefritis**
- **Prostatitis** ^(1,2)

Ciproflox.[®]DM



El único
de liberación
prolonganda

BIBLIOGRAFÍA:

1. David Richard D. y cols.- Rational antibiotic treatment of outpatient genitourinary infections in a changing environment. The American Journal of Medicine 118 (7A): 75-135, 2005.
2. Drekonja D y Johnson J.- Urinary Tract Infections. Prim Care Office Pract 35:345-367, 2008.

REG. NÚM.: 086M2013 SSA IV.
NÚMERO DE ENTRADA: 2511032002C00012

CIPR DM-01D-25

Revisar IPP:



Senosiain[®]