

¿ALERGIAS?





Lideater®

Libera tu día, *respira mejor*

**Es un antihistamínico
indicado para el tratamiento
de procesos alérgicos. ⁽¹⁾**

 **Alivia eficazmente** estornudos,
congestión nasal y urticaria **sin
causar somnolencia** ^(2,3)

 **Se absorbe en los primeros 30
minutos**, aliviando los síntomas
desde los primeros días ⁽⁴⁾



Desloratadina,
ha demostrado actividad:

- 1. Antialérgica**
- 2. Antihistamínica**
- 3. Antiinflamatoria**

Posee características farmacodinámicas y farmacocinéticas que le permiten tener **un rápido inicio de acción.**⁽³⁾

DOSIS ORAL DIARIA (con y sin alimentos)



SOLUCIÓN

EDAD	DOSIS DIARIA
Niños de 6 meses a 11 meses	1.0 mg (2 ml)
Niños de 12 meses a 5 años	1.25 mg (2.5 ml)
Niños de 6 años a 11 años	2.5 mg (5 ml)
Adultos y mayores de 12 años	5 mg (10 ml)

Cada ml equivale a 0.5 mg de Desloratadina

JARABE

EDAD	DOSIS DIARIA
Niños de 6 meses a 11 meses	1.0 mg (2ml)
Niños de 12 meses a 5 años	1.25 mg (2.5 ml)
Niños de 6 años a 11 años	2.5 mg (5 ml)
Adultos y mayores de 12 años	5 mg (10 ml)



Lideater-D[®]


Libera tu día, *respira mejor*

Desloratadina + Fenilefrina

Alivio efectivo contra rinitis alérgica y congestión nasal. ⁽¹⁾



-  **Acción antihistamínica y descongestionante** en una sola fórmula ⁽¹⁾
-  **Combinación única** en el mercado
-  **Pipeta graduada** para una dosificación precisa y sin complicaciones





Lideater-D[®]

- › Mejora la adherencia y optimiza el tratamiento⁽¹⁾
- › Alivio completo en un solo producto



DOSIS ORAL DIARIA (con y sin alimentos)

SOLUCIÓN PEDIÁTRICA

EDAD

DOSIS DIARIA

Niños de 6 a 11 meses

1.0 mg (2 ml)

Niños de 12 meses a 5 años

1.25 mg (2.5 ml)

Lideater®

Lideater-D®



LIDEATER

- › **Jarabe.** Caja con frasco 60 mL y vaso dosificador.
- › **Solución.** Caja con frasco 60 mL y pipeta graduada.

LIDEATER-D

- › **Solución.** Caja con frasco 30 mL y pipeta graduada.

BIBLIOGRAFÍA:

1. López Pérez, G. T., Nuñez Nuñez, M., & Huerta López, J. (2025). Asociación entre desloratadina y fenilefrina para el tratamiento de la rinitis alérgica moderada a grave: ensayo clínico multicéntrico. Acta Pediátrica De México, 46(2), 146-156. <https://doi.org/10.18233/apm.v46i2.2894>
2. Gehe, R. S., & Meltzer, E. O. (2001). Desloratadine: A new, nonsedating, oral antihistamine. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 107(4), 751-762. <https://doi.org/10.1067/mai.2001.114239>
3. Dizdar, E. A. D. (2008). Desloratadine: A Review of Pharmacology and Clinical EFFI CACY in Allergic rhinitis and Urticaria. Therapy. Recuperado 5 de junio de 2025, de <https://www.openaccessjournals.com/articles/desloratadine-a-review-of-pharmacology-and-clinical-efficacy-in-allergic-rhinitis-and-urticaria.pdf>
4. Church, M. K., & Church, D. S. (2013). Pharmacology of antihistamines. Indian journal of dermatology, 58(3), 219-224. <https://doi.org/10.4103/0019-5154.110832>

NÚMERO DE ENTRADA: 2511032002C00039

LIDE-01T-25

Lideater®

Revisar IPP:



Lideater-D®

Revisar IPP:



Senosiain®